

الخلاصة

SUMMARY

أجريت خلال المدة المحصورة ما بين شهر تشرين الأول 1999 وشهر
حزيران 2000 دراسة وبائية للتقصي عن نوعية ونسب انتشار الطفيليات المعوية
في المزارع الصناعية مختلفة في مدينة كربلاء. وقد بلغ عدد العينات المفحوصة
1000 عينة يتأصل من تون السنة إلى 51 سنة فأكثر. فحصت عينات البراز
بواسطة البسطة المباشرة بالتعامل كلوريد الصوديوم (0.9%) ومحلول اليود
حتى يتطرق الطوف القلي المشبع.

تم التعرف على الإصابة بعشرة أنواع من الطفيليات المعوية، خمسة منها
بواسطة البسطة وهي: 7.5% لأميبا القولون *Entamoeba coli*، 10.4% لأميبا
Iodamoeba bütschlii، 9.3% لأميبا
Giardia lamblia، 4.3% لشفوي السياط المسننلي
والتي هي من الإصابة بخسة أنواع من الديدان هي 4.6%
للدودة البوسية *Enterobius*، 9.3% للدودة
Ascaris lumbricoides، 0.6% للدودة
Trichostrongylus axei، 1.8% للدودة الشصية
والتي هي من الإصابة بكثرة بعموم الطفيليات

المعوية. وقد عرفت من البسطة إصابة الذكور والإناث
بالتساوي. كما عرفت من البسطة إصابة في فئة عمر ما دون السنة
و 42.6% من البسطة في فئة عمر 1 سنة فأكثر.

كما عرفت من البسطة إصابة بطفيليات المعوية وعدد أفراد
الأسرة التي عرفت إصابة طفلة في الأسرة التي وصلت
إلى 10 أفراد (100%) بينما سجلت إصابة طفلة في الأسرة