

الخلاصة

٥ - ١

جرمت خلال المدة المحصورة ما بين ايلول ١٩٩٦ ولغاية حزيران ١٩٩٧ دراسة حول

حيوانات الابتدائية المعوية لدى بعض المرضى الوافدين الى مختبرات اثنين من المستشفيات

في مدينة بغداد (مستشفى بغداد التعليمي في جانب الرصافة ومستشفى اليرموك

في جانب الكرخ). تم اجراء فحص مجهري روتيني على ٤٣٣٤ عينة براز باستخدام

الطريقة المعتمدة لافاد ليرود لغرض التقصي عن مدى انتشار الحيوانات الابتدائية

والشهر والاصابة بالعمر ، والجنس ، والتحصيل الدراسي ، وحجم العائلة واشهر السنة .

تتبع نتائج الدراسة الحالية عن وجود ستة انواع من الحيوانات الابتدائية المعوية
في مستشفى بغداد التعليمي ومستشفى اليرموك التعليمي على التوالي :-

الوحل (٣٨,٤٪ ، ٧,٢٪) ، *G.lamblia* (٩,٦٪ ، ٦,٧٪) ، اميبا القولون

(٢٧,٨٪) ، الكيسية الاربعية البشرية (٤,٤٪ ، ٥,١٪) ، المشعرة البشرية

(٢٢,٢٪) وشغوية السياط المسنلية (٢,١٪ ، ٤,٧٪). اما النسبة المئوية للاصابة الكلية في

كانت ٦٣,٧٪ و ٣٥,٧٪ على التوالي .

لاحظ ايضا علاقة واضحة بين نسبة الاصابة والجنس وعلى الرغم من وجود بعض

الاختلافات لا يمكن ان تكون ذات قيمة معنوية احصائيا.

يوجد ان هناك فروقات معنوية بالاصابة بعموم الطفيليات بالنسبة للعمر وفي كلا

المرضى حيث علاقة الاصابة بالمستوى التعليمي للمريض فقد ظهر ان المرضى المؤهلين بالتعليم

اكثر الفئات اصابة (٦٨,٩٪ ، ٤٠,٨٪ على التوالي) اما المؤهلين بالتعليم العالي